


栄養規格表と給餌プログラム

繁殖②

妊娠期間の給餌管理：経産母豚のボディコンディションはキャリパーを用いて測定してください。



- ※1 初産豚の妊娠期間中キャリパーは使用しないでください。初産豚を妊娠期間中にキャリパーで測定すると、「過肥」と誤判定される可能性があります。
- ※2 候補豚の平均交配体重が160kg以上の場合、6.65 Mcal ME/日 または 4.95 Mcal NE/日（およそ1日当たりの妊娠期給餌量が250g増加）の給餌としてください。
→交配時の体重が160kgを超える候補豚は2産以降の体重が重くなり、維持レベルが増加するため
- ※3 妊娠期において母豚のボディコンディションを調整することはとても難しく、ボディコンディションを下げるにより生じるリスクは過肥の状態で分娩を行うリスクより高いため。
 - 給餌量はボディコンディションと飼料エネルギーレベルによって調整してください。
給餌量算出例: 3 Mcal ME/kgの飼料の場合：5.9 Mcal ME/日 ÷ 3 Mcal ME/kg = 2 kg/日
 - ベースラインとなる給餌レベルは、飼料形状、ヘルスステータス、季節、飼養方法、候補豚平均交配体重等をコンスタントにモニタリングし、調整してください。